

(財団) 検査ニュース

平素より、佐賀県健康づくり財団 佐賀県健診・検査センターの業務にご協力とご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

今回は、「検査内容の変更」についてご案内いたします。

なお、財団ホームページ(検査ニュース)にも掲載していますので、ご参照ください。

佐賀県健康づくり財団

佐賀県健診・検査センター


■ 検査内容の変更について

2026年7月3日(金)ご依頼分より ■


案内書掲載頁	項目コードNo.	検査項目	変更内容	現	新	備考
52	2401	骨型酒石酸抵抗性酸性フォスファターゼ (TRACP-5b)	基準値 (単位)	男性：170～590 女性(YAM)：120～420 (mU/dL)	男性：変更ありません 女性 閉経前：120～420 閉経後：250～770 (mU/dL)	ガイドラインに沿った 試薬添付文書記載 の基準値変更
56	1454	フォン・ウィルブランド因子抗原定量	検査方法 基準値 (単位)	ラテックス凝集反応 50～155 (%)	ラテックス免疫比濁法 非O型：66～176 O型：42～141 (%)	測定試薬の変更に 伴う、基準値、検査 方法等の変更
56	1442	フォン・ウィルブランド因子活性 (リストセチンコファクター)	検査方法 基準値 (単位)	固定血小板凝集法 60～170 (%)	ラテックス免疫比濁法 非O型：61～240 O型：48～202 (%)	
82	1626	ハプトグロビン	検査方法 検体量 (mL)	ネフェロメトリー 0.5	TIA 0.6	
92	3061	膵グルカゴン	基準値 (単位)	空腹時 5.4～55.0 (pg/mL)	空腹時 8.8～45.2 (pg/mL)	
92	1612	ミオグロビン	検査方法 基準値 (単位)	CLIA 男性：154.9以下 女性：106.0以下 (ng/mL)	CLEIA 男性：15.8～105.9 女性：10.5～70.0 (ng/mL)	
94	3044	レニン濃度	材料	血漿	血漿・血清	
—	3051	アルドステロン/レニン濃度比	材料	血漿	血漿・血清	有効材料に血清の 追加

≪ 関連図 ≫


●フォン・ウィルブランド因子抗原定量




●フォン・ウィルブランド因子活性(リストセチンコファクター)



●ハプトグロビン



●膵グルカゴン



●ミオグロビン

